

Số: / HD-TTBVTV

Thái Bình, ngày tháng 4 năm 2021

## HƯỚNG DẪN Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2021

Từ ngày **01/5 - 05/5/2021** trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại nở rộ, bệnh đạo ôn hại cổ bông có nguy cơ gây hại cao trên các giống nhiễm, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời thì sâu bệnh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa Xuân. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh trên đồng ruộng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật sau:

**\*Thời gian tổ chức phòng trừ: Từ ngày 01/5 - 05/5/2021**

**1. Sâu cuốn lá nhỏ:** Phòng trừ trên những diện tích có mật độ sâu 20 con/m<sup>2</sup> trở lên, chủ yếu trên trà lúa trở bông sau ngày 30/4 trở đi.

\* Đối với sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc sau: Ammate 150EC pha 5ml; Takumi 20WG pha 4 gam; Director 70EC pha 25ml; Clever 150SC pha 6ml (300WG pha 3 gam); Thamaten 150SC pha 8ml; Sunset 300WG pha 3,8gam; Match 50EC pha 10 ml; Map Dona 265 EC pha 20 ml; Bite 30SC pha 8 ml; August 350 WG pha 3 gam; Abacard-HB 50EC pha 25 ml; Emingold 160SC pha 5,4 ml; Indogold 150SC pha 7,5 ml; AMATE USAMY 150SC pha 8ml; ... với 16 - 20 lít nước phun cho 1 sào để phòng trừ.

Vùng có mật độ sâu cao, sâu non nở kéo dài nên sử dụng một trong các loại thuốc như Dylan10WG; Angun 5WG; Topsix 82WG ... phối hợp với các loại thuốc trừ sâu cuốn lá khác để tăng hiệu quả phòng trừ.

### **2. Sâu đục thân 2 chấm:**

- Vùng có nguồn sâu đục thân 2 chấm cao khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc như: Prevathon 5SC; Virtako 40WG; Voliam Targo 063 SC... để phòng trừ, lịch phòng trừ cùng với sâu cuốn lá nhỏ.

**3. Rầy các loại:** Ở đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ này cần kết hợp với phòng trừ rầy cho những ruộng có mật độ rầy 800 con/m<sup>2</sup> trở lên để hạn chế công phun thuốc và nguồn rầy cho lúa sau. Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc như: Penalty40WP; Oshin 20WP; Midan10WP; Sutin 5EC; Chess

50WG; Palano 600WP; Hasuper 300WP; Laroma 700WG; Applaud-bas 27WP ... để phòng trừ.

#### **4. Bệnh đạo ôn cổ bông:**

Các giống lúa nhiễm bệnh như lúa BC15, TBR225; Q5; Thiên ưu 8; nếp... toàn bộ diện tích lúa trở bông trước ngày 5/5 phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần.

- Lần 1 vào thời điểm lúa thấp tho trở
- Lần 2 khi ruộng lúa trở thoát hoàn toàn.

Diện tích lúa trở bông sau ngày 05/5 nếu lúa trở gặp không khí lạnh, gặp mưa thì phải chỉ đạo phòng trừ trên giống nhiễm. Khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các thuốc như: FILIA 525 SE; BUMP 650WP; BEAM 75WP; Kasoto 200SC; FUARMY 30WP; Bankan 600WP; Fendy 25WP; Map Famy 700WP; Fujione 40EC; Feliso 360EC ... để phòng trừ.

\* **Kỹ thuật pha thuốc và phun thuốc:** Thuốc trước khi phun cần được pha đều trong chai 0,5 - 1lít đầy nắp, lắc đều cho tan (dung dịch mẹ) sau đó mới cho vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước thuốc cần phun. Khi phun thuốc phải phun xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá lúa, sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng dẫn./.

#### **Nơi nhận:**

- Cục BVTV;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng NN các huyện; phòng kinh tế TP;
- Các phòng, trạm trực thuộc;
- Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp trong tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Xuân Thanh**